Questionnaire de symptômes urinaires Urinary Symptom Profile - USP[©]

> Avant de commencer à remplir le questionnaire, merci d'inscrire la date d'aujourd'hui
//_/ // // Jour Mois Année
Les questions suivantes portent sur l'intensité et la fréquence des symptômes urinaires que vous avez eu au cours des <u>4 dernières semaines</u> .
Pour répondre aux questions suivantes, il vous suffit de cocher la case qui correspond le mieux à votre situation. Il n'y a pas de « bonnes » ou de « mauvaises » réponses. Si vous ne savez pas très bien comment répondre, choisissez la réponse <u>la plus proche de votre situation</u> .
Nous vous remercions de remplir ce questionnaire dans un endroit calme et si possible seul(e). Prenez tout le temps qui vous sera nécessaire.
Une fois que vous avez terminé, glissez ce questionnaire dans l'enveloppe ci-jointe et remettez-le tout à votre médecin.
Nous vous remercions de votre participation.

Il peut vous arriver d'avoir des fuites d'urine lors de certains efforts physiques, soit importants (telles qu'une pratique sportive ou une quinte de toux violente), soit modérés (tels que monter ou descendre les escaliers) ou encore légers (tels que la marche ou un changement de position).

1. <u>Durant les 4 dernières semaines</u>, pouvez-vous préciser le nombre de fois par semaine où vous avez eu des fuites au cours d'efforts physiques :

Merci de cocher une case pour chacune des lignes 1a, 1b et 1c.

	Jamais de fuite d'urine	Moins d'une fuite d'urine par semaine	Plusieurs fuites d'urine par semaine	Plusieurs fuites d'urine par jour
1a. Lors des efforts physiques importants		\square_1	\square_2	\square_3
1b. Lors des efforts physiques modérés			\square_2	\square_3
1c. Lors des efforts physiques légers	\square_0	\square_1	\square_2	\square_3

2.	Combien de fois par semaine avez-vous dû vous précipiter aux toilettes pour uriner en raison de besoin urgent ?							
	\square_0	\square_1	\square_2	\square_3				
	Jamais	Moins d'une fois par semaine	Plusieurs fois par semaine	Plusieurs fois par jour				
3.	Quand vous êtes pris par vous retenir?	r un besoin urgent d'urin	er, combien de minutes	s en moyenne pouvez-vous				
	\square_0		\square_2	\square_3				
	Plus de 15 minutes	De 6 à 15 minutes	De 1 à 5 minutes	Moins de 1 minute				
4.	4. Combien de fois par semaine avez-vous eu une fuite d'urine précédée d'un besoin urgent d'urine que vous n'avez pas pu contrôler ?							
	\square_0	\square_1	\square_2	\square_3				
	Jamais	Moins d'une fois par semaine	Plusieurs fois par semaine	Plusieurs fois par jour				
4 bis. Dans ces circonstances, quel type de fuites avez-vous ?								
	\square_0	\square_1	\square_2	\square_3				
	Pas de fuites dans cette circonstance	Quelques gouttes	Fuites en petites quantités	Fuites inondantes				

Durant ces 4 dernières semaines et dans les conditions habituelles de vos activités sociales,

professionnelles ou familiales :

Durant ces 4 dernières semaines et dans les conditions habituelles de vos activités sociales, professionnelles ou familiales :

5. Pendant la journée, quel est le temps habituel espaçant deux mictions (action d'uriner) ?

 \square_0 \square_1 \square_2 \square_3

Deux heures ou plus Entre 1 heure et 2 Entre 30 minutes et 1 Moins de 30 minutes heures heure

6. Combien de fois en moyenne avez-vous été réveillé (e) la nuit par un besoin d'uriner ?

 \square_0 \square_1 \square_2 \square_3


0 ou 1 fois 2 fois 3 ou 4 fois Plus de 4 fois

7. Combien de fois par semaine avez-vous eu une fuite d'urine en dormant ou vous êtes-vous réveillé(e) mouillé(e) ?

Jamais Moins d'une fois par Plusieurs fois par Plusieurs fois par jour semaine semaine

Partie réservée au médecin : reporter sur l'échelle ci-dessous la somme des items 2 + 3 + 4 + 4 bis + 5 + 6 + 7

SCORE «HYPERACTIVITE VESICALE»



professionnelles ou familiales : 8. Comment décririez-vous votre miction (action d'uriner) habituelle durant ces 4 dernières semaines ? \square_0 \square_1 \square_2 \square_3 **Normale** Nécessité de pousser avec les Nécessité d'appuyer sur le Vidange par sonde muscles abdominaux (du bas ventre avec les mains urinaire ventre) ou miction penchée en avant (ou nécessitant un changement de position) 9. En général, comment décririez-vous votre jet d'urine ? \square_0 \square_3 **Normal** Jet faible Goutte à goutte Vidange par sonde urinaire 10. En général, comment s'effectue votre miction (action d'uriner) ? \square_0 \Box_1 \square_2 \square_3 Miction normale et Miction difficile à Vidange par sonde Miction débutant Miction très lente du début jusqu'à rapide débuter puis facilement mais urinaire s'effectuant longue à terminer la fin normalement Partie réservée au médecin : reporter sur l'échelle ci-dessous la somme des items 8 + 9 + 10SCORE «DYSURIE » \odot 0 2 3 4 5 7 9 1 6 8

Durant ces 4 dernières semaines et dans les conditions habituelles de vos activités sociales,

Vérifiez que vous avez bien répondu à toutes les questions.

Merci de votre participation